

สรุปผลการดำเนินการ การประเมินการใช้ยาอย่างสมเหตุผลและยามูลค่าสูง  
โรงพยาบาลขุนหาญ

1. Augmentin inj. (Amoxicillin 1000 mg + Clavulanic acid 200 mg)

- มีการสั่งใช้ในผู้ป่วย 205 ราย

- แบ่งตามข้อบ่งใช้ ดังนี้

1. การติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนล่าง ได้แก่ ปอดบวม หลอดลมอักเสบชนิดเฉียบพลันและเรื้อรัง เมื่อใช้ยาขนาดอื่นๆแล้วไม่ให้เกิดผลการรักษาที่ดี จำนวน 21 ราย

2. การติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน เช่น ไซนัสอักเสบ หูชั้นกลางอักเสบ ทอนซิลอักเสบ เมื่อใช้ยาขนาดอื่นๆแล้วไม่ให้เกิดผลการรักษาที่ดี จำนวน 30 ราย

3. การติดเชื้อของผิวหนังและเนื้อเยื่ออ่อนกรณีเมื่อใช้ยาขนาดอื่นๆแล้วไม่ให้เกิดผลการรักษาที่ดี จำนวน 142 ราย

4. การติดเชื้อของกระดูกและข้อต่อ เช่น osteomyelitis จำนวน 5 ราย

5. เลือดเป็นพิษเนื่องจากการติดเชื้อ จำนวน 7 ราย

- มีการปรับขนาดยาตามการทำงานของไต 100%

2. Meropenem inj. (1 gm)

- มีการสั่งใช้ในผู้ป่วย 59 ราย

- จำแนกเป็นเพศหญิง 37 ราย และเพศชาย 22 ราย

- เหตุผลในการใช้ยา คือ

1. เป็นการให้ยาต่อเนื่องในผู้ป่วยที่ถูกส่งตัวกลับมาให้รักษาต่อที่รพช. (Refer back) จำนวน 20 ราย

2. ให้ในการติดเชื้อในโรงพยาบาลที่ไม่ตอบสนองต่อยาอื่น (Empiric therapy) จำนวน 39 ราย

- มีการปรับขนาดยาตามการทำงานของไต 100%