

**สรุปผลการดำเนินการ การประเมินการใช้ยาอย่างสมเหตุผลและยามูลค่าสูง
โรงพยาบาลขุนหาญ**

1. Augmentin inj. (Amoxicillin 1000 mg + Clavulanic acid 200 mg)

- มีการสั่งใช้ในผู้ป่วย 21 ราย รายละเฉียด ดังนี้
-แพทย์สั่งใช้ยาเหมาะสม 21 ราย
-ขนาดยาไม่เหมาะสมปรึกษาแพทย์ปรับยา 0 ราย

2. Meropenem inj. (1 gm)

- มีการสั่งใช้ในผู้ป่วย 18 ราย รายละเฉียด ดังนี้
-แพทย์สั่งใช้ยาเหมาะสม 17 ราย
-ขนาดยาไม่เหมาะสมปรึกษาแพทย์ปรับยา 1 ราย

3. Ceftazidime injection 1 gm

- มีการสั่งใช้ในผู้ป่วย 65 ราย รายละเฉียด ดังนี้
-แพทย์สั่งใช้ยาเหมาะสม 59 ราย
-ขนาดยาไม่เหมาะสมปรึกษาแพทย์ปรับยา 6 ราย

4. Tazocin injection 4.5 gm

- มีการสั่งใช้ในผู้ป่วย 12 ราย รายละเฉียด ดังนี้
-แพทย์สั่งใช้ยาเหมาะสม 12 ราย
-ขนาดยาไม่เหมาะสมปรึกษาแพทย์ปรับยา 0 ราย